

Taxa de dose e manifestações prodômicas / Rango de dosis y manifestaciones prodromales

RANG O DE DOSIS (Gy)	INICIO DE LA MANIFESTACIÓN TRAS LA EXPOSICIÓN (HORAS) Y PORCENTUAL DE INDIVIDUOS AFECTADOS																
	ANOREXIA		NAÚSEAS			VÓMITOS			ASTENIA			DIARREA			CEFALEA		
	Inicio (h)	%	Inicio (h)	%	Intensidad	Inicio (h)	%	Intensidad	Inicio (h)	%	Intensidad	Inicio (h)	%	Intensidad	Inicio (h)	%	Intensidad
0,5-1	1	15-50	6	5-30	L	5	5-20	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-2	½	50-90	3	30-70	L/M	3-4	20-50	L/M	3	30-60	L	-	-	-	-	-	-
2-3,5	<1/2	90-100	2	70-90	M	3	50-80	M	2-3	60-90	M	4-6	10	M	-	-	-
3,5-5,5	<1/2	100	<1/2	90-100	M	1	80-100	I	2	90-100	M/I	3-4	10	M/I	8	50	L/M
5,5-7,5	<1/2	100	<1/2	100	M	<1	100	I	1	100	I	2	10	M/I	2	80	M
7,5-10	<1/2	100	<1/2	100	I	<1/2	100	I	<1/2	100	I	2	10	I	2	100	M
10-20	<1/2	100	<1/2	100	I	<1/2	100	I	<1/2	100	I	2	20	I	2	100	I
20-30	<1/2	100	<1/2	100	I	<1/2	100	I	<1/2	100	I	2	30	I	2	100	I

Intensidad: L (leve); M (moderada); I (intensa)

(*) Adaptado de Young, R.W. Acute Radiation Syndrome, in Military Radiobiology